

# CLENPIQ

## Instrucciones para la preparación de la colonoscopia

### 5 DÍAS ANTES:

- Si no ha recibido la preparación CLENPIQ, por favor llame al consultorio de su médico.
  - Suspenda todos los formadores de heces (Metamucil, FiberCon, Citrucel), vitaminas y hierro, pero continúe con sus otros medicamentos.
  - Si está tomando anticoagulantes, planee detenerlos de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- 

### 2 DÍAS ANTES:

- Deje de comer nueces, semillas y verduras crudas.
- 

### 1 DÍA ANTES:

- **Solo consuma líquidos claros.**
  - Deje de consumir alimentos sólidos hasta después de su procedimiento.
  - Deje de consumir leche o productos lácteos, crema de soja o no láctea, pulpa de jugo, alcohol, y nada de color rojo o morado.
  - Beba por lo menos ocho vasos de 8oz de líquido claro (64oz) durante el día.
- 

### NOCHE ANTES DE LA COLONOSCOPIA A LAS 5 PM:

1. Beba la **primera dosis** de CLENPIQ (1 botella premezclada de seis onzas).
  2. Beba 5 tazas de líquido claro (40oz) durante 5 horas.
- 

### DÍA DE LA COLONOSCOPIA: 5 HORAS ANTES DE LA HORA DE LLEGAR AL PROCEDIMIENTO:

1. Beba la **segunda dosis** de CLENPIQ (1 botella premezclada de seis onzas).
  2. Beba 4 tazas (8oz cada una) o más de líquido claro.
- 

### 3 HORAS ANTES DE LA HORA DE LLEGAR AL PROCEDIMIENTO:

- **Deje de beber todo líquido.**
- **Tome todos los demás medicamentos de la mañana con un pequeño sorbo de agua 3 horas antes.**
- **No beba nada más después de este tiempo.**